

# 新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン

(令和4年2月28日版)



千葉県マスコットキャラクター  
「チーバくん」

新型コロナウイルス感染症については、これまで、度重なる新たな変異株の出現により、幾度となく感染拡大の局面に直面し、その都度、各学校において、様々に対応を実施してきたところです。今後も、広く社会において、この新型コロナウイルスへの対応は、ある程度長い期間を必要とすることが見込まれます。そこで、今後の学校における感染症対策を実施していくに当たっては、これまで行ってきた基本的な感染症対策の徹底は継続しつつ、新たな変異株の特性を踏まえた、特に留意して実施すべき対策に重点を置くなどして、学校が、感染症対策を継続することとともに、学びの継承という視点から、教育活動の機会をしっかりと確保することとの両立を図っていくことが、極めて重要です。

このため、各学校においては、本ガイドラインの各対策を確実に行なうことを基本として、新たな変異株の特性、各学校における実情等を踏まえた、対策の重点化、焦点化等も検討し、実効性のある対応をお願いいたします。

また、一部の教職員のみに負担がかかることのないよう学校全体で組織的に実行していくことについても、十分な配慮をお願いいたします。

各学校における対策の確認にあたっては、本ガイドラインの各対策項目の冒頭にある□（チェックボックス）を利用し、常に万全の対策がとられているか確認をお願いします。

本ガイドラインを参考に、学校における新型コロナウイルスの感染及びその拡大防止に向け、引き続き、感染症対策の徹底をお願いいたします。

（本ガイドラインは、最新の知見や状況等を踏まえ、随時、改訂してまいります。）

## 【目次】

1	校内体制の整備	1
2	連絡体制の整備	2
3	家庭との連携	3
4	学校における感染対策の基本	4
5	健康観察の徹底	6
6	基本的な感染症対策の徹底 ＜対策別＞	12
	＜場面別＞	12
7	感染者等が発生した場合の対応 (1) 感染者が発生した場合の対応 (2) 濃厚接触者が発生した場合の対応 (3) 感染が疑われる者が発生した場合の対応 (4) 出席停止等の取扱い（感染・濃厚接触者以外の場合を含む）	26 26 32 34 35
8	児童生徒等への正しい知識等の指導と心のケア	38
9	教職員の感染症対策の徹底等	41

# 1 校内体制の整備

各学校においては、当面の間、新型コロナウイルス感染症対策にあたる対策本部を設置し、学校全体で感染症対策に取り組む体制を整備することとする。

設置にあたっては、学校の規模や教職員構成に応じた対策本部を組織するものとし、以下の例を参考に、実働的な対策本部となるよう努める。

## ＜対策本部の役割＞

平時：感染症対策の検討・実施、児童生徒等及び教職員の健康状況確認 等  
感染者等発生時：対応の総括・指示、保健所との連絡、情報発信 等


## ＜対策本部の設置例＞

〔例1〕既存の委員会等を利用して設置する。

(例) • 企画委員会  
• 連絡調整会議 等       対策本部


〔例2〕基本メンバーを決め、扱う内容によりメンバーを増減する。

(例) 感染者発生時



〔例3〕対策本部に加え、小チームを設置する。

(例)



## **2 連絡体制の整備**

### **(1) 関係機関への連絡**

あらかじめ、学校所在地を管轄する保健所、教育委員会、学校医等の緊急連絡先一覧を作成し、教職員間で共有する。

### **(2) 教職員への連絡**

- 緊急時の連絡網やメール配信など、休日や夜間等の連絡方法を明確にし、改めて教職員間で共有する。
- 校長は、教職員が感染者となった場合など、本人以外の緊急連絡先が必要となった場合に備え、可能な範囲で把握しておく。

### **(3) 保護者、児童生徒等への連絡**

保護者への連絡体制（メール配信、電話による連絡など）を確認する。また、学校のホームページを活用した情報提供方法を検討する。

### 3 家庭との連携

児童生徒等の感染経路として、「家庭内感染」が最多である現状を踏まえ、家庭から学校に感染を広げないよう、各家庭の理解と協力を得る。

#### (1) 健康観察、登校の判断

- 児童生徒等は、毎朝、登校前に検温及び風邪症状の確認を行う。  
同居の家族にも、毎朝、検温等の健康状態の確認を依頼する。
- 児童生徒等は、発熱や風邪症状がある場合は、自宅で休養する。  
感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、同居の家族に発熱や風邪症状がある場合も、登校を控えるよう依頼する。
- 以下の場合は、PCR検査等の結果が判明するまで登校を控えるよう依頼する。
  - ・同居の家族が、濃厚接触者に特定されPCR検査等を受ける場合
  - ・児童生徒等又は同居の家族が、濃厚接触者ではないが医師や保健所の指示等でPCR検査等を受ける場合

#### (2) 休日や学校外の活動

- 学校外でも、換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まるなどを避ける。
- 特に、活動範囲が広がる高校生等は、学校外の私的な活動や交流等に際し、十分な感染症対策が講じられているか確認し、行動する。
- 感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、不要不急の外出を控える、仲の良い友人同士での飲食店や遊興施設でのマスクを外した会話や家庭間の行き来を控える、家族ぐるみの交流による接触を控えるなど、学校を通じた人間関係の中で感染が広がらないように十分に注意する。

#### (3) 家庭から学校への連絡

以下の場合は、速やかに学校へ連絡するよう依頼する。

- ・児童生徒等が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は濃厚接触者に特定された場合(同居の家族が感染した等)。
- ・同居の家族が、濃厚接触者に特定されPCR検査等を受ける場合
- ・児童生徒等又は同居の家族が、濃厚接触者ではないが医師や保健所の指示等でPCR検査等を受ける場合

## 4 学校における感染対策の基本

### (1) 感染症予防の3原則

#### □ 感染源を絶つ

⇒ 発熱や風邪症状のある者等の自宅休養の徹底

本ガイドラインP6~11「5 健康観察の徹底」

- (1) 家庭における登校前の検温・風邪症状の確認
- (2) 学校における登校時の健康状態の確認
- (3) 外部からの来校者に対する健康状態の確認

#### □ 感染経路を絶つ

⇒ 手洗い、咳エチケット、清掃及び消毒の徹底

本ガイドラインP12~16「6 基本的な感染症対策の徹底」

- ・石けんによる手洗い
- ・咳エチケット
- ・学校施設や用具等の清掃及び消毒

#### □ 身体全体の抵抗力を高める

⇒ 基本的な体調管理に努め、  
規則正しい生活を心がける

- ・十分な休養及び睡眠
- ・適度な運動
- ・バランスのとれた食事 など

## (2) 集団感染のリスクへの対応

リスクが高まるとされる、3つの条件（3つの密：密閉、密集、密接）の「重なり」はもちろんのこと、「1つ1つの条件」が発生しないことを目指す。

「3つの密」と「大声」は、リスクが高いとされることから注意する。

- 「密閉(換気の悪い密閉空間)」の回避 ⇒ 換気の徹底

本ガイドライン P16 「換気」

- 「密集(多数が集まる密集場所)」の回避 ⇒ 身体的距離の確保

本ガイドライン P17 「児童生徒等同士、教職員  
—児童生徒等の身体的距離の確保」

- 「密接(間近で会話や発声をする密接場面)」への対応  
⇒ マスクの着用

本ガイドライン P13 「マスクの着用」

## 5 健康観察の徹底

学校において感染源を絶つためには、外からできるだけウイルスを持ち込まないよう努めることが重要となる。

### (1) 家庭における登校前の検温・風邪症状の確認

□児童生徒等は、毎朝登校前に、家庭で検温と風邪症状の確認を行い、発熱や風邪症状がある場合は自宅で休養することを徹底する。

(同居の家族に発熱等があれば学校へ伝えていただく。感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、同居の家族に発熱や風邪症状がある場合は、児童生徒等は登校を控えるよう依頼する。)

取組例：毎朝、児童生徒等が、自身の健康状態等について、可能な限り、家庭で「連絡用ツール」を活用し、登校前に報告する。「連絡用ツール」によることができない場合は、「健康観察カード」(別紙1)を記入し、登校時に学校へ提出する。

□以下について、別紙2等を活用し、保護者へ周知しておく。

#### 【発熱等がある場合の相談及び対応】

・発熱等の症状がある場合は、まずは、日ごろ通院しているかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話で相談する。

(直接、医療機関を受診せず、事前に必ず電話で相談すること)

・かかりつけ医等の地域で身近な医療機関がない場合は、自宅近くの発熱外来を実施している医療機関に電話で相談する。

#### P7 【県内の発熱外来指定医療機関】

・発熱外来が近くにない場合等は、P7【相談窓口】に電話で相談する。

・次の＜相談・受診の目安＞にあてはまる場合は、すぐに相談する。

#### ＜相談・受診の目安＞

少なくともいずれかに該当する場合は、すぐに相談する。

(該当しない場合も相談可)

◆息苦しさ（呼吸困難）、強いたるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

◆基礎疾患等があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

◆上記以外で、発熱や咳など、比較的軽い風邪症状が続く場合

(症状が続く場合は必ず相談。症状には個人差があるため、強い症状と思う場合はすぐに相談。解熱剤等を飲み続けなければならない場合も同様)

- ・小児は小児科医による診察が望ましいため、かかりつけ小児医療機関に相談する。かかりつけ小児医療機関がない場合は、自宅近くの発熱外来を実施している小児医療機関や「千葉県発熱相談センター」に電話で相談する。

#### 【県内の発熱外来指定医療機関】

※発熱外来を実施している医療機関の一覧は、千葉県ホームページページ参照。（「[熱があるときは](#)」のページを参照。）

#### 【相談窓口】（かかりつけ医がいない等、相談先に困った時）

- ◆発熱相談センター
  - ・千葉県発熱相談センター
  - ・千葉市・船橋市・柏市の各相談センター
- ◆市町村役場（千葉市・船橋市・柏市を除く）
- ◆発熱相談医療機関

※各相談窓口の電話番号等は、千葉県ホームページ参照。  
（「[電話相談窓口（コールセンター）等について](#)」のページを参照。）

※「**千葉県新型コロナウイルス感染症お問合せチャットボットサービス**」（日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語対応）でも、発熱相談窓口を案内。




- ・保健所からの健康調査を迅速、円滑なものとするため、検査を受検したら、「新型コロナウイルス感染（疑い）者事前登録システム I M A B I S（イマビス）」への登録を行う。

※登録方法等は、千葉県ホームページ参照。（「[新型コロナウイルス感染症の検査を受検された方へ](#)」のページを参照。）


- ・ワクチンを接種した後、身体に異常を感じたり、体調不良が続いたりする場合は、「**千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口**（下記参照）」または医療機関に相談する。

#### 【千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口】

- ◆電話番号：03-6412-9326
- 受付時間：24 時間（土・日・祝日含む）



※千葉県ホームページ「熱があるときは」より



## (2) 学校における登校時の健康状態の確認

毎日、登校時、児童生徒等に発熱や風邪症状がないことを教職員が確認する。家庭で確認できなかった児童生徒等は、学校が定めた場所で、検温及び風邪症状の確認を行う。また、感染者発生時等に備え、健康観察の記録は学校で当月及び前月分を確実に保管する。

※確認できなかった児童生徒等が多数いる場合は複数の教職員で連携して対応する。



取組例：児童生徒等は、可能な限り、家庭で「連絡用ツール」を活用し、登校前に報告する。

(「連絡用ツール」によることができない場合は) 児童生徒等は、教室に入る前に、担任等に健康観察カードを提出する。カード等を忘れた、家庭で確認できなかった、再度確認したい等の児童生徒等は、教室に入る前に所定の場所に行き、担当の教職員が検温・風邪症状の確認を行う。

※高等学校の事例：P10 参照

### 学校で（登校時、登校後） 児童生徒等の発熱や風邪症状等を確認した場合

- ・児童生徒等の発熱や風邪症状等の体調不良を把握した時は、そのまま教室等に居続けさせることなく、すみやかに校内の所定の場所にて担当職員が検温や問診等の体調確認を行う。  
なお、国から配付された「抗原定性検査キット」を活用する際は、抗原簡易キットの活用の手引き※を十分確認すること。  
(※令和3年9月6日付け教安772号  
「抗原簡易キットの活用の手引きの周知について(通知)」参照)
- ・帰宅するまでの間、学校にとどまる場合は、他の人との接触を可能な限り避けられるよう、症状を考慮した上で、別室で待機させる等、配慮する。
- ・発熱や風邪症状等の児童生徒等を安全に帰宅させ、症状がなくなるまで自宅で休養させる。
- ・必要に応じて受診を勧め、その後、受診や検査の状況を確認する（受診の際はP6【発熱等がある場合の相談】を参考に、事前に必ず医療機関へ電話で相談するよう伝える。P6＜相談・受診の目安＞にあてはまる場合はすぐに相談するよう伝える）。

## 県立高等学校で行われている健康観察の事例

- ・生徒は、登校時、昇降口にいる学年職員に健康観察カードを提示し、職員がその場で確認を行う。確認ができない生徒は、昇降口横の専用スペースにいる職員に申し出て、その場で検温・体調確認を受ける。(全日制)
- ・生徒は、朝8時までにWeb上の専用アンケートフォームから健康状態を送信する。養護教諭が送信状況の一覧表を学年別にプリントアウトし、昇降口にいる各学年職員に渡す。昇降口にいる学年職員は、各生徒に健康状態を確認する際、未入力の生徒に対してその場で検温等を行う。(全日制)
- ・登校時、健康観察カードの体調欄に記載がある生徒、体温が一定以上の生徒、カードを忘れた生徒、健康観察をしてきていない生徒は、昇降口にいる学年職員に申し出た後、保健室に行き養護教諭が聞き取り等を行う。それ以外の生徒は、教室入口の箱に健康観察カードを入れて入室し、朝のHR時に担任・副担任が改めて点検する。(全日制)
- ・学習支援ソフトにより、毎朝5時に自動配信されるアンケート(体温、健康状態等)に、生徒は朝8時までに回答する。担任、養護教諭、管理職は、Web上かプリントアウトし回答された内容を確認し、体調不良等がある生徒については、登校時点で(すでに登校てしまっている場合は呼びに行き)、保健室(または専用の部屋)へ移動させて確認を行う。(全日制)
- ・登校時、職員が昇降口で非接触型体温計を用いて全生徒の検温及び健康状態を確認し、対応した職員は全校生徒が一覧になった健康観察シートに結果を記録する。体調不良等の生徒は管理職と保健室へ報告し対応する。(定時制)

### (3) 外部からの来校者に対する健康状態の確認


- 外部からの来校者に対し、来校前の検温及び健康状態の確認を依頼するとともに、必要に応じ、玄関等での検温等を実施する。
- 来校時に発熱や風邪症状が見られる場合には、校内への立ち入りや教育活動等への参加を見合させていただく。
- 外部からの来校者に対し、マスク着用、手洗いや手指のアルコール消毒等、感染症対策の徹底を依頼する。

## 6 基本的な感染症対策の徹底

学校医・学校薬剤師等と連携し、保健管理体制を整備するとともに、教育活動全般を通じ、適切な消毒や清掃により、環境衛生を良好に保つよう努める。

また、変異株への対策としても、従来株と同様に、「3つの密」の回避、マスクの着用、手洗いなどの基本的な感染症対策の徹底に努める。

さらに、既にワクチンを接種した教職員や児童生徒においても同様に、基本的な感染症対策を継続する。



### <対策別>

#### ・石けんによる手洗い

□登校直後、トイレ使用後、共用の教材・教具・情報機器などを使用する前後、昼食前後等こまめに行う。

※手洗いを行う前に、目や顔を触らないよう、注意喚起する。

※手洗い場の数が十分でない場合もあることから、授業前後等は、手洗いの時間に配慮する。

□手洗い場には石けん等を配置し、児童生徒等が手洗いできる環境を整備する。

□手指用アルコール消毒液は、流水での手洗いができない際に補助的に用いられるものであることから、まずは、石けんによる手洗いを徹底し、手指用アルコール消毒液を設置できる場合には、補助的に使用する。

## ・咳エチケット

□他者に感染させないために、マスクの着用を基本とするが、咳・くしゃみをする際は、マスクの他ティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえるよう児童生徒へ指導する。

## □マスクの着用

- ・マスクは正しい方法で着用する。（鼻と口を覆う。）
- ・最も高い効果があるとされる不織布マスクを着用することが望ましい。
- ・不織布マスクが最も高い効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があるとされていることを、児童生徒及び保護者に適宜情報提供する。
- ・身体的理由で不織布マスクの着用が困難な場合もあることから、マスクの種類による偏見や差別が生じないよう十分配慮する。
- ・マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒等の様子なども踏まえ、現場で臨機応変に対応する（例：P20「登下校」）。特に、基礎疾患有するためマスクの着用が困難である等の場合には、主治医や学校医とも相談の上、適切に対応する。
- ・マスク着用時は、のどが渴かなくても定期的に水分補給する等、脱水や熱中症に注意する。
- ・マスクがない、マスクを忘れた児童生徒等に対応できるよう、学校は可能な限り、予備用のマスクを準備しておく。
- ・無症状の感染者も他者へ感染させる恐れがあるので、学校教育活動においては、身体的距離が十分にとれないときは、飛沫を飛ばさないよう、次の場合を除いて基本的にマスクを着用する。

## マスクを着用する必要がない場合

- ◆ 十分な身体的距離が確保できる場合
- ◆ 気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い日  
(熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合)
  - ◎マスクを外す際は、できるだけ人との十分な距離を保つ、近距離での会話を控えるようにするなどの配慮をすることが望ましいが、熱中症も命に関わる危険があることから、熱中症への対応を優先する。
  - ◎児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた時などは、マスクを外したり、一時的に片耳だけにかけて呼吸したりするなど、本人の判断でも適切に対応できるよう指導する。
  - ◎登下校中については、他の児童生徒等や一般の人と十分な身体的距離が確保できる場合。
- ◆ 体育の授業及び運動部活動  
運動時は身体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ない。特に、呼気が激しくなる運動を行う際や、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日には、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症などの健康被害が発生するリスクがあるため、児童生徒の間隔を十分に確保するなどの十分な感染症対策を講じた上で、マスクを外す。また、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高くない日に、呼吸が激しくならない軽度な運動を行う際、児童生徒等がマスクの着用を希望する場合は、マスクの着用を否定するものではないが、児童生徒等の体調の変化に十分注意する。

## ・ 学校施設や用具等の清掃及び消毒

普段の清掃及び消毒は、通常の清掃活動の中に、ポイントを絞って消毒の効果を取り入れる。児童生徒等の手洗いが適切に行われている場合には、必要に応じた作業のみとし、過度な消毒作業とならないよう留意する。

また、「新型コロナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含む家庭用洗剤」等を用いて、発達段階に応じて児童生徒が行つても差し支えない。

感染者が発生した場合は、P31（「消毒」）を参考に消毒を行う。

## (1) 清掃及び消毒のポイント

### □大勢がよく手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチ他)

1日に1回、水拭きした後、消毒液\*を浸した布巾やペーパータオルで拭く(P16、別紙3～6参照)。学校薬剤師等とも連携することが望ましい。

なお、児童生徒等の手洗いが適切に行われている場合には、これらの作業を省略しても差し支えない。

\*消毒用エタノール、新型コロナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含む家庭用洗剤、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.05%)、一定の条件を満たした次亜塩素酸水や亜塩素酸水を用いる。

### □共用の教材・教具・器具・用具など

児童生徒等及び教職員とともに、使用の都度の消毒は不要であるが、使用前後の手洗いを徹底する。

### □トイレや洗面所

「新型コロナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含む家庭用洗剤」を用いて、通常の清掃活動の範囲で清掃する(特別な消毒作業は不要)。

#### 下痢等でトイレが汚れた場合

「次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.1%)又は遊離塩素濃度100ppm(100mg/L)以上の亜塩素酸水消毒液」で、便器・便座・ドアノブ・流水レバー・トイレットペーパーホルダーなどを消毒する。(次亜塩素酸ナトリウム消毒液は、感染性胃腸炎にも有効。児童生徒等には扱わせないこと。)

### □机・椅子

衛生環境を良好に保つため、清掃活動において、「新型コロナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含む家庭用洗剤」を用いて拭き掃除を行うとよい(特別な消毒作業は不要)。

### □清掃用具等

衛生状態を良好に保ち、劣化に注意する。

### □十分な換気やマスク着用等の感染症対策を講じる。作業後は石けんによる手洗いを十分に行う。

## (2) 消毒について

### 【注意事項（各消毒液共通）】

- 消毒作業中は換気を十分に行い、目、鼻、口、傷口などを触らない。
- 消毒液をペットボトル等の容器に入れる際は、誤って飲むこと等がないよう、容器に消毒液であることを明記し、児童生徒等の手が届かない場所に置く。
- 人がいる環境で、空間噴霧しない（吸入や目・皮膚への付着による健康被害の恐れあり）。

※各消毒液の詳細は、別紙3～6を参照のこと

### ・ 換気

「密閉」の回避に加え、「3つの密」と「大声」にも注意し、換気の徹底を図る。特に、冬場は空気が乾燥し飛沫が飛びやすくなるため、徹底して換気に取り組む。

- 気候上可能な限り、常時換気に努める（常時換気が難しい場合は30分に1回以上、数分間程度、窓を全開する。それも難しい場合は、少なくとも休み時間ごとに窓を全開する）。**十分な換気ができているかを把握し適切な換気を確保するために、適宜学校薬剤師等の支援を得つつ、換気の目安としてCO<sub>2</sub>モニターにより二酸化炭素濃度を計測することも考えられる。**
- 換気は、教室の窓側と廊下側など、2方向の窓（やドア）を同時に開けて行い、廊下の窓も開ける。
- 窓（やドア）を開ける幅は10cm～20cm程度を目安とし、上の小窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられる。
- 窓のない部屋では、常時入口を開けておいたり、換気扇を用いたり、扇風機等で部屋の外に空気が流れるようにする等、換気に努める。

- 冷暖房使用時においても換気は必要。（冷房時は換気で室内温度が高くなるので、エアコンの温度設定をこまめに調整する。）
- 換気扇等の換気設備がある場合は、常時運転する。ただし、換気設備だけでは換気能力が足りず、窓開け等による自然換気と併用が必要な場合が多いことに注意する。換気設備は清掃を行う。
- 換気に伴う室温低下で健康被害が生じないよう、校内での保温・防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応する。児童生徒等及び保護者に温かい服装を心がけるよう十分周知しておく。
- 適度な加湿はウイルス飛散防止の一助となるが、マスクを着用している場面が多いことなどに鑑み、無理のない範囲で取り組む。

#### ・児童生徒等同士、教職員－児童生徒等の身体的距離の確保

換気や咳エチケット等を行った上で、

- 児童生徒等の座席の間に、可能な限り距離を確保する（おおむね1～2m）。
- 対面とならないような形で教育活動を行うことが望ましい（授業・給食等）。
- 座席等を使用しない場合であっても、身体的距離（おおむね1～2m）を確保して対応することが望ましい。

#### ・その他

- 発熱や風邪症状の見られる児童生徒等の対応にあたる教職員は、マスクを着用し、必要に応じて使い捨て手袋、ゴーグル、フェイスシールド等を着用する。対応後は、手洗い等を行う。使い捨てできない物（ゴーグル、フェイスシールド等）は、適切に消毒する。

- 発熱や風邪症状の見られる児童生徒等の対応にあたり、保健室以外に別室を設けることが難しい場合は、保健室内をついたて等で区切り対応エリアを分ける等により、他の児童生徒等（ケガ、心身の不調等）と可能な限り接しないようする。
- 医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患有する児童生徒等の登校や校内での活動等については、主治医や保護者等と連携を密にし、一人一人の状況に応じた適切な支援が図られるよう、より慎重な対応を行う。
- 特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症対策については、以下も参考とする。
  - ・「特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症対策に関する考え方と取組について（通知）」（令和2年6月19日 文部科学省）
- トイレ内はよく換気する。フタがあるトイレの場合は、フタを閉めて水を流す。

## 感染症対策下における熱中症対策

□ 気温が上がる季節にあっては、体が暑さに十分慣れていない、疲れがたまっている等の状況も予想される中、感染症対策を行いつつも、例年以上に熱中症予防に努める。

### ＜対策ポイント＞

- ・エアコンのある教室等を中心に活動する。
- ・冷房時でも換気は必要であり、換気で室内温度が高くなるので、エアコンの温度設定をこまめに調整する。
- ・マスクを着用している場合は、強い負荷の作業等を避け、のどが渴かなくても定期的な水分補給を心掛ける。
- ・身体的距離が十分にとれないときは、基本的にはマスクを着用するが、マスクを着用する必要がない場合についてはP13を参照。
- ・毎日の検温や風邪症状を含めた体調の確認は、熱中症予防においても有効。体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で休養する。

### ＜従来からの対策の徹底＞

- ・暑さ指数（WBGT<sup>※</sup>）等を参考に、無理のない範囲で活動（急に暑くなったら時は要注意）
- ・活動前、活動中、活動後の適切な水分・塩分の補給
- ・個人の条件（体調や体力）を十分に考慮など

※WBGT33°C以上で熱中症警戒アラートが発表される。

□ 热中症を疑って救急搬送（または医療機関で受診）する際は、正確な情報提供を行う。

熱中症が疑われるのか、それとも新型コロナウイルス感染症が疑わしいのか等、医療機関における判断の一助となるよう、救急隊（または医療機関）に対し、可能な範囲で正確な情報を伝える。

### ＜伝える情報の例＞

- ・基本情報（いつ、誰が、どうして、どのような状態か、持病等）
- ・行っていた教育活動とその活動環境  
※倒れたり症状が現れた時の現場の状況を伝えることが重要。  
(活動内容、時間、場所、天気、気温・室温、湿度 等)
- ・当日までの健康状態等（発熱、風邪症状、その他症状等）  
(例:3~4日前に風邪症状あり、濃厚接触者である 等)
- ・家族の状況（家族が発熱中、家族が濃厚接触者である 等）

## ＜場面別＞

教職員の目が届きにくい場面（登下校、休み時間、校内での移動時、部活動の準備・片付けなど）においても、3つの条件（密閉、密集、密接）が発生しないよう、児童生徒等に感染症対策の考え方を理解させるとともに、必要に応じて、ルール設定、放送や掲示物の活用など、指導の工夫を図る。

特に感染が拡大局面にある地域においては、感染対策を講じてもなお、感染リスクが高い活動については、実施を控えることを検討するなど、慎重な判断をすること。

各教育活動の詳細については、P25の[参照通知]に掲載の各通知内容によること。

### ・登下校

- 校門や昇降口での密集が起こらないよう、動線を工夫する。
- 気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高い時は、他の児童生徒等や一般の人と十分な身体的距離が確保できる場合はマスクを外すよう指導する。小学生など、マスクを外してよいか判断が難しい子供へは、積極的に声かけ等を行う。その際、人と十分な距離を確保し、会話を控えることも指導する。
- 公共交通機関を利用する場合は、特に、手で目や顔を触らないよう注意し、降車後（または学校到着後）は速やかに手を洗う。
- 飲食店や遊興施設等への立ち寄りは慎み、やむを得ない場合を除き、自宅と学校間は直行直帰をするよう指導する。

### ・特別支援学校スクールバス

- 児童生徒等の状況に配慮しつつ、エアコンの外気導入や定期的な窓開け等による換気を行う。
- 通路側の席を空けたりビニールカーテンで座席を区切ったりする等して、児童生徒等同士の身体的距離の確保に努める。
- スクールバス内の密集を避けるために、保護者の負担等も考慮しながら引き続き送迎を依頼する。

## □スクールバスの運行にあたっての留意事項

- ・スクールバス内の消毒(手すり、窓座席等児童生徒がよく触れるところ)
- ・家庭での健康チェックの徹底(乗車前に体温、咳等を健康カードにて確認)
- ・乗車前後の石けんによる手洗いや消毒液による手指の洗浄
- ・乗車中のマスクの着用(着用できない児童生徒はこの限りではない)
- ・バス停などでのこまめな車内換気
- ・運行時間の短縮(バス停の集約等)

## ・各教科活動等

次に示すような活動については、本県又は地域の感染状況に応じて、その実施方法を検討することとし、**感染が拡大局面にある場合には実施しないことも含め、慎重に判断する。**具体的な対応については、関連通知によるものとする。(P25の[参照通知])

### 【感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い教育活動の例】

- ・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」
- ・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」
- ・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」
- ・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」
- ・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」
- ・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」
- ・職業等に関する授業における対面による製品等の販売会

□教室等の活動場所は、P16「換気」に従い、換気の徹底を図る。

□身体的距離が十分にとれないときは、飛沫を飛ばさないよう、基本的にはマスクを着用する※。(※マスクを着用する必要がない場合等についてはP14参考。)

□教職員は飛沫をとばさないようマスクを着用し、児童生徒等と可能な限り身体的距離（おおむね1～2m）の確保に努める。

- マスク着用時は、のどが渴かなくても定期的に水分補給する等、脱水や熱中症に注意する。
- 教材・教具・器具・用具などを共用で使用する場合は、児童生徒等及び教職員とともに、使用前後の手洗いを徹底するものとし、使用の都度の消毒は不要であるが、1日1回程度、消毒を行うことが望ましい。
- 特別支援学校における自立活動や日常生活に関する指導等については、児童生徒等との身体的接触がやむを得ないことから、例えば、児童生徒等にかかる者を限定する等、指導方法や内容を工夫する。

#### ・給食、昼食等を含む飲食する場面

- 飲食する際は、飛沫飛散防止のため、机に向かい合わせにしない、大声を出さない、身体的距離がとれない場合は会話を控える。食事後等に歓談する際は必ずマスクを着用する。
- 特に高等学校では、教室以外で飲食する場合も想定されるが、向かい合わせに座らない、車座にならない、身体的距離がとれない場合は会話を控える、飲み物・食べ物・ストロー等を共有しない、飲食時以外はマスクを着用する等について、確実に指導する。
- 給食当番だけでなく、全ての児童生徒等が食事の前の手洗いを徹底する。
- 食堂の利用は、時間差を設けたり、場所を分散したりする等の工夫をする。
- 給食の配膳を行う児童生徒等及び教職員は、手洗いを徹底し、マスクを着用する。また、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したか等、給食当番活動が可能であるかを毎日点検し、適切でないと認められる場合は給食当番を代えるなどの対応をとる。

- 配膳時の密集・密接を避けるため、必要があれば献立の品数を減らすことも考えられるが、その場合、適切な栄養が摂取できるように工夫する。
- 食後等に、学校で歯磨きや洗口を行う場合は、換気の良い環境で、児童生徒等がお互いに距離を確保し、飛沫が飛び散らないよう注意しながら行うよう指導するなど、感染リスクに配慮する。
- 飲食時には十分な換気を行う。特に、食事前に室内の空気と外気の入れ替えが行われていることが望ましい。

#### ・休み時間

- 教室等の窓（やドア）を大きく開放し、十分な換気を行う。
- 特別教室やグラウンド等での活動後やトイレ使用後等、手洗いを徹底する。
- 3つの条件（密閉、密集、密接）が発生しやすい場面であり、休み時間中の行動について、必要に応じてルールを設定する等、指導の工夫をする。
- 他学級の児童生徒同士が集まることを控えるよう指導する。

#### ・清掃活動

- マスクを着用して行うとともに、清掃後は石けんを使用して手洗いを行う。
- 窓やドアを大きく開放し、十分な換気の下で行う。

#### ・図書館（図書室）、パソコン室など

- 利用の前後に手洗いをするというルールを徹底する。
- 室内で、児童生徒等の密集が生じないよう、利用方法を工夫し、換気、身体的距離が十分にとれない場合のマスク着用など基本的な感染症対策に努める。

## ・寄宿舎

- 「寄宿舎における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和2年5月22日 千葉県教育委員会）を参考とする。

## ・学校行事

- 地域の感染状況等を踏まえ、実施に当たっては、感染症対策を確實に講じるとともに、活動の内容や方法、実施の時期や場所等について工夫する。

## ・修学旅行

- 「令和3年度修学旅行の実施における留意点について（通知）」（令和3年6月1日 千葉県教育委員会）を参考とする。

## ・部活動

□ **活動前の健康観察**、活動前後の手洗い・消毒の徹底、また、屋内で実施する場合は、換気を徹底する。

□ 部室等の共有エリアの一斉利用を控えるなど、多数の者が密集しないよう十分留意する。

□ 部室や更衣室等の密になりやすい場所では、マスクの着用を徹底する。やむを得ず更衣等でマスクを外す場合は、身体的距離を確保し会話はしない、マスクを外す時間は極力短くする等の使用ルールを明確にし、遵守させる。

□ 部活動前後や部室内での集団での飲食は控える。

□ 感染が拡大局面にある場合は、密集する活動や近距離で組み合ったり接触したりする活動、大きな発声や激しい呼気を伴う活動は基本的に控える、又は、感染が拡大していない地域では実施を慎重に検討する。

- 公式大会への参加については、令和3年5月21日付け教学指第288号他「新型コロナウイルス感染症の感染者が発生している県立学校における部活動の大会参加について（通知）」によるものとする。
- 对外試合や合宿等については、感染状況に応じて発出される通知を参照すること。

### 〔参考通知〕

上記の他、各教育活動の詳細については、以下に示すこれまでの通知を参照すること。

- ◇本県に、「緊急事態宣言」が発令されている場合の教育活動等  
「緊急事態宣言の延長に伴う同宣言期間中の県立学校の教育活動等について（通知）」  
(令和3年9月9日付け教学指第760号、教特第512号、教安第789号、教体第527号)
- ◇本県が、「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域とされた場合の教育活動等  
「まん延防止等重点措置の適用に伴う県立学校の対応について（通知）」  
(令和4年1月20日付け教学指第1355号、教特第918号、教安第1273号、教体第859号)
- ◇「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が解除された場合  
「緊急事態宣言の解除に伴う県立学校の教育活動等について（通知）」  
(令和3年9月29日付け教学指第873号、教特第574号、教安第870号、教体第571号)

なお、今後の感染状況等の変化によって、上記通知の内容が更新された場合は、新たな通知によること。

## 7 感染者等が発生した場合の対応

以下のチェック項目を参考に、対策本部を中心として教職員で分担して対応にあたる。なお、平時から、感染者発生時に保健所へ直ちに情報提供できるよう資料等を準備しておく（参考：P27 提供資料例）。

### （1）感染者が発生した場合の対応

感染者が発生した場合、学校には、通常、本人（や保護者）から感染が判明した旨の連絡がされる。また、学校での感染拡大の可能性がある場合には、保健所から連絡が入る。

#### ア 初動対応

##### 【児童生徒等又は教職員の場合】

- 感染した児童生徒等については、保健所が指示する期間、学校保健安全法第19条に基づく出席停止とする。感染者が教職員の場合は、療養休暇の取得により出勤させない。（P32 参照）
- 感染者の発生を把握後、管理職は速やかに教育委員会に電話報告する。
  - ・県立学校→学校危機管理担当
  - ・市町村立学校→市町村教育委員会→教育事務所→学校危機管理担当
- 対策本部の招集、全教職員への連絡を行う。
- 感染者本人に関わる情報を速やかに収集する。  
保健所の指導の下、本人のプライバシーに配慮し、学校が把握できる範囲で本人の行動履歴等を時系列で速やかに整理する。

##### 児童生徒等の場合

健康状態（発症日、症状等）、クラス、部活、通学手段、出席状況  
発症2日前の行動履歴（部活動の状況、授業等の状況、休憩・昼食時の状況、校外活動の状況）、学校のスケジュール等

##### 教職員の場合

健康状態（発症日、症状等）、教科、クラス、部活、分掌、通勤手段、勤務状況、発症2日前の行動履歴（部活動の状況、授業等の状況、休憩・昼食時の状況、校外活動の状況）、学校のスケジュール等

- 学校医等へ感染者発生を報告する。
- 保健所との対応窓口は原則、管理職とし、保健所へ連絡する。
- 保健所への速やかな情報提供により、保健所の行う「濃厚接触者や検査対象者（以下、「濃厚接触者等」）の特定」に協力する。  
保健所の指導の下、感染者本人の行動履歴に基づき、児童生徒等及び教職員の接触者のリスト等を速やかに作成し、直ちに保健所へ情報提供を行う。

<提供資料例>

関係者名簿（クラス別、授業別、部活動別、教職員、マスクを外して接觸した者※）、健康観察記録（児童生徒等及び教職員）、校内の感染症対策の状況（マスクの着用状況、昼食時の様子、消毒・換気・手洗い等の状況）、座席表、時間割表、校舎配置図、学校行事に係る資料、スクールバス乗車名簿 等

※食事を共にした、体育や部活動で活動を共にした等

- 保健所の指導の下、対策本部は教育委員会等と連携して、今後の対応を検討する。

## ○濃厚接触者等の特定について

### ◆濃厚接触者の特定について

- ①当該感染者に対する濃厚接触者の特定について、管轄の保健所と協議する。
- ②(①が難しい場合)本人、保護者、周辺の友人等の関係者からの聞き取り(※1)を行い、本人の同意を得た上で、以下に示す基準(※2)に基づき濃厚接触者の候補範囲を特定し(濃厚接触者の候補者の特定)、候補者リストを管轄の保健所に提示する。保健所の認定により、濃厚接触者としての特定がなされる。
- ③(②が難しい場合)本人、保護者、周辺の友人等の関係者からの聞き取り(※1)を行い、本人の同意を得た上で、必要に応じて、県教育委員会学校安全保健課保健班と協議し、以下に示す基準(※2)に基づき濃厚接触者の候補を特定する。

#### ※ 1 [本人を含む関係者からの聞き取り]

例えば、次に示す事項について詳細に確認する。

- ・発症日（又はそれと認められる日。無症状者の場合は、陽性確定に係る検体採取日。以下同じ。）
- ・受診、検査、陽性判明までの経緯（家族内での感染状況を含む。）
- ・発症日から、発症日を除く前2日間の詳細な行動履歴（いつ、どこで、誰と、何を、どのようにしていたか。感染リスクが高いと思われる行動につ

いては、特に詳細に聞き取り、その時間、身体的距離、マスクの着用状況等について確認する。マスクについては、着用の有無に限らず、適切な着用状況であったかについても確認する。)

#### ※2 [濃厚接触者の候補となる範囲を特定する基準]

濃厚接触者の候補の範囲は、感染者の感染可能期間（※※）のうち、当該感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において以下のいずれかに該当する者とする。

※※ 発症2日前（無症状者の場合は、陽性確定に係る検体採取日の2日前）から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間

##### 【濃厚接触者の候補】

- ・感染者と同居（寮や寄宿舎等において感染者と同室の場合を含む。）又は長時間の接触があった者
- ・適切な防護なしに感染者を介護していた者
- ・感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性の高い者（1メートル以内の距離で互いにマスク無しで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する場合がある。）
- ・手で触れることができる範囲（目安として1メートル）で、必要な感染予防対策なし（※※※）で感染者と15分以上の接触があった者（例えば、感染者と会話していた者）
- ※※※ 必要な感染予防対策については、マスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスク着用が不適切な状態である場合を含む。

#### ◆濃厚接触者周辺の検査対象となる者の特定について

基本的に、濃厚接触者の特定と同様の対応を行うが、検査対象となる者の候補の範囲を特定する基準は、以下のいずれかに該当する者とする。

##### 【濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補】

- ・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者（感染者と同一の学級の児童生徒等）
- ・大声を出す活動、呼気が苦しくなるような運動を共にしていた者等（感染者と同一の部活動に所属する児童生徒等）
- ・感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者等（感染者と同一の寮や寄宿舎で生活児童生徒等）
- ・その他、感染症対策が不十分な環境で感染者と接触した者等

※学校において、上記の濃厚接触者等の候補について、速やかな特定が困難な場合は、感染者が1人でも、感染状況によっては、原則として当該感染者者が属する学級等の全ての者を検査対象の候補とすることが考えられる。

※濃厚接触者の候補者の特定については、保健所による積極的疫学調査の実施が遅延したり十分に行えなくなったりする場合があることを踏まえ、特に地域の実情に応じて柔軟な対応を行うことがある。

## ○臨時休業の判断について

教育委員会は、感染者が発生した場合、保健所により濃厚接触者等が特定されるまでの間、学校保健安全法第20条に基づく臨時休業の要否を判断し、必要と判断される場合は臨時休業を実施する。

### [休業1] 感染者発生～濃厚接触者等の特定までの間

感染者発生から濃厚接触者等の特定まで、まずは臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、学校全体の臨時休業又は学部閉鎖)の要否を検討する。ただし、感染が広がる可能性が低い場合には、臨時休業を行わない場合もある。



### [休業2] 濃厚接触者等の特定後、校内で感染が広がる恐れが低いと判断されるまでの間

学校の感染状況と休業2の取扱いの目安(P27参照)を踏まえ、校長と県教育委員会の協議の上、その後の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、学校全体の臨時休業又は学部閉鎖)を判断する。ただし、濃厚接触者等がいないなど学校内で感染が広がる可能性が低い場合には、休業2の臨時休業を行わない。

※休業の期間については、臨時休業の開始から全体として概ね数日～5日程度（土日祝日を含む。）を目安とする。

## ○臨時休業の範囲や解除について

### 「休業1」の範囲について

感染者が発生した場合、原則として、濃厚接触者等が特定され、休業2の要否を判断するまでの間、学校保健安全法第20条に基づく臨時休業を行うこととし、複数の学年で感染者が発生した場合は学校全体の臨時休業、単一の学年で発生した場合は学年閉鎖とする。

ただし、例えば感染経路が家庭内であり、感染者の校内での接触者が極めて少ない場合など、感染が学級を越えて校内で広がる恐れがないと判断される場合は、学級閉鎖等とすることもある。

### 「休業1」の解除について

濃厚接触者が特定され、休業2の要否が判断された場合、休業1は解除されることとなる。従って、休業2が必要となる場合は休業2に移行することとなり、休業2が不要となる場合は学校再開となる。

## 「休業2」の範囲について

### ア 学級閉鎖

- 以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
  - ①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
  - ②感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
  - ③1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
  - ④その他、校長と教育委員会との協議により必要と判断した場合  
(※ただし、学校に2週間以上来ていない者の発症は除く。)
- 学級閉鎖の期間としては、**5日程度**を目安に、児童生徒等の健康状態等を踏まえて判断する。

### イ 学年閉鎖

- 複数の学級を閉鎖するなど、学年内に感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。

### ウ 学校全体の臨時休業又は学部閉鎖

- 複数の学年を閉鎖するなど、学校内や学部内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業又は学部閉鎖を実施する。

### エ 部活動の停止措置

- 特定の部活動で感染者や濃厚接触者が複数見られ、部活動内で感染が広がっている可能性が高い場合、当該部活動の停止措置をとる。また、アからウまでの休業を実施する場合は、感染者の参加状況等を踏まえた上で、所属する部活動の停止措置をとる。

### オ 濃厚接触者等の出席停止等の措置

- 濃厚接触者等として特定された児童生徒等については、出席停止の措置とする。濃厚接触者等が教職員である場合には、職務の専念義務の免除により出勤させないようにする。
- この場合において、濃厚接触者については最終接触日の翌日から**7日間**の出席停止又は職務に専念する義務の免除の措置をとる。検査対象者については、検査で陰性が確認された場合に、出席停止等の解除の措置をとる。なお、検査を実施しない検査対象者の出席停止等の解除の措置については、当該児童生徒等や教職員の健康状態をもとに判断する。

## 「休業2」の解除について

児童生徒等や教職員(感染者や濃厚接触者を除く。)の健康観察において風邪等の症状が見られない場合(学年単位や学級単位の感染が広がる恐れがない場合)は臨時休業を解除することを可とする。

- 臨時休業を行う場合等は、保護者宛て連絡内容を検討し、緊急メール等を活用して、児童生徒等の自宅待機等について連絡するとともに、各学年主任等は臨時休業中の健康観察や学習課題等を児童生徒等に連絡する。
- 他の児童生徒等及び教職員の健康状態を改めて確認するとともに、欠席者等の受診・PCR検査等の状況を確認する。
- 感染者の家庭と連絡を取り、状況に応じて支援に努める。
- 必要な場合は、学童や放課後デイサービスへ連絡する。
- 教職員の勤務体制を整備する。(教職員に濃厚接触者等がいる場合を想定)
- 報道対応の窓口を決定し、教育委員会と連携し情報を収集・整理する。

## イ その他

### 【児童生徒等又は教職員の場合】

- 感染拡大防止の必要上、感染者が明らかになることもあるが、その場合においても、差別・偏見・いじめなどの対象とならないよう、十分な配慮や注意を行う。
- 県立学校にあっては、続報(濃厚接触者等の特定状況・検査結果など)を県教育委員会に電話報告する(管理職→学校安全保健課保健班)。
- 濃厚接触者等へ適切な対応を実施する。  
保健所から、濃厚接触者等とされた者は、自宅待機を行い、保健所の指示に従う。
- 以下により、消毒を行う。
  - ・保健所等の指導の下、消毒エタノール、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.05%)又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水消毒液を使用し、感染者本人の行動範囲を考慮し、接触箇所(可能性のある箇所を含む)等、校内の消毒を行う(必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必要はない)。
  - ・トイレについては、消毒エタノール、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.1%)又は遊離塩素濃度100ppm(100mg/L)以上の亜塩素酸水消毒液を使用し消毒する。
  - ・物の表面でのウイルスの生存期間(およそ24時間～72時間)を考慮し、消毒ができない場所や物は、立ち入りや使用を禁止するなどの処置も考えられる。

## (2) 濃厚接触者が発生した場合の対応

学校には、通常、本人（や保護者）から濃厚接触者に特定された旨の連絡がされる。

### 【児童生徒等又は教職員の場合】

- 濃厚接触者（候補者として指定した者を含む。以下同じ）について、保健所が自宅待機などを求めた期間、学校保健安全法第19条に基づく出席停止とする。濃厚接触者が教職員である場合は、職務の専念義務の免除により出勤させないようにする。（P35 参照）
- 濃厚接触者の発生を把握後、状況に応じて対策本部を招集し、全教職員への連絡を行う（教育委員会への報告は原則不要）。
- 保健所との対応窓口は原則、管理職とし、必要に応じて保健所へ連絡する。
- 対策本部は、その後、濃厚接触者本人の「感染」が判明した場合に、直ちに保健所へ情報提供し、速やかな濃厚接触者等の特定につながるよう、本人の行動履歴に基づき、資料を準備しておく。

#### ＜準備資料例＞

関係者名簿（クラス別、授業別、部活動別、教職員、マスクを外して接触した者※）、健康観察記録（児童生徒等及び教職員）、校内の感染症対策の状況（マスクの着用状況、昼食時の様子、消毒・換気・手洗い等の状況）、座席表、時間割表、校舎配置図、学校行事に係る資料、スクールバス乗車名簿 等  
※食事を共にした、体育や部活動で活動を共にした等

- 濃厚接触者等が、差別・偏見・いじめなどの対象とならないよう、十分な配慮や注意を行う。
- 必要に応じて、保健所の指導の下、他の児童生徒等の健康観察を行う。

- 症状のない濃厚接触者等が触った物品に対する消毒は不要とされるが、必要に応じて、保健所等の指導の下、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(0.05%)又は遊離塩素濃度25ppm(25mg/L)以上の亜塩素酸水消毒液を使用し、濃厚接触者本人の行動範囲を考慮し、接触箇所(可能性のある箇所を含む)等、校内の消毒を行う。
- 濃厚接触者等のPCR検査等の結果が陽性だった場合は、速やかに(1) 感染者が発生した場合の対応(P26)へ移行する。

### (3) 感染が疑われる者※が発生した場合の対応

※医師や保健所の指示等により、新型コロナウイルス感染症を診断するためのPCR検査等を受ける者。

#### 【児童生徒等又は教職員の場合】

- 感染が疑われる者の発生を把握後、状況に応じて対策本部を招集し、必要に応じて全教職員への連絡を行う（教育委員会への報告は不要）。
- 対策本部は、その後、感染が疑われる者本人の「感染」が判明した場合に、直ちに保健所へ情報提供し、速やかな濃厚接触者等の特定につながるよう、本人の行動履歴に基づき、資料を準備しておく。

##### ＜準備資料例＞

関係者名簿（クラス別、授業別、部活動別、教職員、マスクを外して接触した者※）、健康観察記録（児童生徒等及び教職員）、校内の感染症対策の状況（マスクの着用状況、昼食時の様子、消毒・換気・手洗い等の状況）、座席表、時間割表、校舎配置図、学校行事に係る資料、スクールバス乗車名簿 等  
※食事を共にした、体育や部活動で活動を共にした等

- PCR検査等の結果が判明するまで、学校保健安全法第19条に基づく出席停止とすることが可能。  
(教職員の服務はP36 参照)
- 感染が疑われる者が、差別・偏見・いじめなどの対象とならないよう、十分な配慮や注意を行う。
- PCR検査等の結果が陽性だった場合は、速やかに(1) 感染者が発生した場合の対応 (P26)へ移行する。
- PCR検査等の結果、感染が確認されなかった場合の登校・出勤の可否については、医師・保健所等の指示に従う。

#### (4) 出席停止等の取扱い(感染・濃厚接触者以外の場合を含む)

児童生徒等の出席停止等の取扱いは、原則として以下のとおりとする。  
なお、参考として教職員の場合の服務を示すが、詳細は教育委員会へ確認すること。

状況		児童生徒等の出席停止等の取扱い	教職員
(1)	感染が判明した場合	治癒するまで(保健所が指示する期間)、「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とする。	療養休暇 (臨時の任用職員・会計年度任用職員は特別休暇により取り扱うことができる)
(2)	濃厚接触者等に特定された場合	保健所が自宅待機などを求めた期間(感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から2週間が基本)、「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とする。 <small>(文部科学省:学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 2021.11.22Ver7より)</small>	職務に専念する義務の免除
(3)	発熱や風邪症状が見られる場合	「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とする。 <small>(文部科学省:学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 2021.11.22Ver7より)</small>	特別休暇
(4)	児童生徒等に症状等はないが、同居する家族に発熱や風邪症状が見られる場合	感染経路の不明な感染者数が増加している地域では、 「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とすることが可能である。 <small>(文部科学省:学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 2021.11.22Ver7より)</small>	特別休暇 (当該職員が勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に限る。)
(5)	同居する家族が、濃厚接触者に特定された場合	PCR検査等の結果が判明するまで、「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とすることが可能である。	特別休暇

状況		児童生徒等の出席停止等の取扱い	教職員
(6)	児童生徒等又は同居の家族が、濃厚接触者ではないが、医師や保健所の指示等でPCR検査等を受けた場合	PCR検査等の結果が判明するまで、「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とすることが可能である。	特別休暇
(7)	医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等が主治医や学校医に相談の上、登校すべきでないと判断された場合	「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする。 (文部科学省:学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 2021.11.22Ver7より)	教職員本人に症状有: 特別休暇 (診断書等あれば療養休暇)
(8)	海外から帰国・再入国し、一定期間自宅等での待機を要請された場合	その期間は、「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とする。(その後、健康状態に問題がなければ登校可) (文部科学省:教育活動の実施等に関するQ&A、新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン令和3年2月19日改訂より)	検疫法第16条第2項に規定する停留(これに準ずるもの)の対象となつた場合: 特別休暇
(9)	児童生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合	「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とすることが可能である。 (文部科学省:新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することについての考え方及び留意点等について令和3年6月22日事務連絡より)	職務に専念する義務の免除
(10)	ワクチン接種による副反応が出た場合	「学校保健安全法第19条に基づく出席停止」とすることが可能である。 (文部科学省:新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することについての考え方及び留意点等について令和3年6月22日事務連絡より)	職務に専念する義務の免除

状況	児童生徒等の出席停止等の取扱い	教職員
(11) 児童生徒等に 症状等はない が保護者から 感染が不安で 学校を休ませ たいと相談さ れた場合	<p>例えば、生活圏において感染経路不明の患者が急激に増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合、その他校長が必要と認める場合 →「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とする。</p> <p>（文部科学省：新型コロナウイルス感染症に対応した持続な学校運営のためのガイドライン令和3年2月19日改訂 参考）</p>	
(12) 県の PCR 検査 等無料化事業 を受検する場 合	<p>検査実施拠点は、課業日以外にも稼働しており、必ずしも課業日に受検する必要はないことから、「欠席」とする。ただし、検査のうち PCR 検査及び抗原定量検査の結果を待つために、やむを得ず出席できない場合に限り、上記（11）の対応を可とする。</p>	

＜参考＞

校長は、新型コロナウイルス感染症にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、学校保健安全法に定める第一種感染症として、治癒するまで出席を停止させることができる。

【学校保健安全法第19条、令和2年1月31日付け文部科学省事務連絡より】

## 8 児童生徒等への正しい知識等の指導と心のケア

児童生徒等が、新型コロナウイルス感染症及びその感染予防対策について正しい知識を身に付け、自ら感染のリスクを避ける行動をとることができるよう、指導資料※等を活用し、発達段階に応じた指導を行う。

また、中学校及び高等学校等、年齢が上がるにつれ、教職員の直接的な監視下にはない行動や、自主的な活動が増えることから、生徒自ら衛生管理に留意するよう指導する。

特に、昼食を含む飲食の場面、部室や更衣室等でマスクを外した場面、下校時の飲食等について指導の徹底が求められる。指導に当たっては、当事者意識を高め、自身の適切な行動により学校から感染者を出さない、広げないという自覚と実践に向けた心の醸成に努めることとする。

### かけがえのない いま 学校生活を守るために



マスクを外した時、最も感染リスクが高まります。マスク着用やこまめな手洗いなどの小さな行動の積み重ねにより、かけがえのない学校生活を守っていきましょう。

千葉県教育委員会

令和3年5月10日教安第200号 指導資料

## ＜※指導資料 指導内容の例＞



- ・手洗いは接触感染を予防するのに効果があること。
- ・手洗いは正しい方法で行わないと予防にならないこと。
- ・飛沫感染を防ぐためにも、何もせずに咳やくしゃみをしたり、咳やくしゃみを手でおさえたりせずに、3つの咳エチケットを実践すること。  
　　<3つの咳エチケット>  
　　① マスクを着用する。(口・鼻を覆う。)  
　　② マスクがないときは、ティッシュやハンカチで口・鼻を覆う。  
　　③ マスクがなく、とっさの時は袖で口・鼻を覆う。
- ・感染症を予防するには、運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を続けることが有効であること。
- ・私たち一人一人が、感染症を予防するためにできることをしっかりといくことが大切であり、自分の生活や体調を振り返り行動することが感染拡大防止にもつながること。
- ・3つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り「密閉」「密集」「密接」しないようにすること。
- ・SNSで氾濫しているデマや誤った情報に惑わされないよう注意すること。
- ・心配なことがあったら、一人で抱え込まずに、周囲の人相談すること。
- ・感染者、濃厚接触者等、医療従事者、社会機能の維持にあたる方等とその家族に対する誤解や偏見に基づく差別は許されないこと。

※『新型コロナウイルス感染症の予防～子供たちが正しく理解し、実践できることを目指して～』(令和2年4月 文部科学省)

[https://www.mext.go.jp/a\\_menu/kenko/hoken/08060506\\_00001.htm](https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm)

## ＜その他 指導例＞

- ・例えば、マスクをしていない、咳をしている、登校時における検温で熱がある、医師の指示等により出席を控えているなどの児童生徒等への偏見や差別が生じないよう、新型コロナウィルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行う。
- ・ワクチン接種は任意のものであることを前提に、ワクチンの接種を受ける又は受けないことによって、差別やいじめなどが起きることのないよう別紙7のリーフレット等を活用し、次の点について指導する。
  - ◆ワクチン接種をしたかどうか、無理に聞かないこと。
  - ◆ワクチン接種をしようとしている人に、接種をやめるよう言わないこと。
  - ◆ワクチン接種をしていない人に、接種を無理強いしないこと。
  - ◆ワクチン接種したこと、していないことを理由とした、仲間外れやいじめは絶対にしないこと。

「新型コロナワクチンの接種に係るいじめの防止について（通知）」  
(令和3年9月16日付け教児生第273号、教安第818号) 参照

- ・ワクチン接種について、偏った情報でなく、信頼できる情報を得るようにする。

<p>厚生労働省 新型コロナワクチン Q&amp;A</p>  <p><a href="https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/">https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/</a></p>	<p>県医師会推奨 こびナビ</p>  <p><a href="https://covnavi.jp">https://covnavi.jp</a></p>
---	---

- ・児童生徒等の心のケアは重要であることから、きめ細やかな健康観察等により児童生徒等の状況を的確に把握するとともに、学校医と連携した健康相談等の実施、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による心理面および福祉面からの支援等、関係教職員が組織的に対応すること。また、相談窓口（「24時間子供SOSダイヤル」やSNS相談窓口等）を適宜周知すること。

## 9 教職員の感染症対策の徹底等

多数の児童生徒等と接する立場にあることから、日頃から体調管理に努め、職場はもとより職場外でも感染症対策の徹底に努める。

特に、医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患有する児童生徒等と接する機会がある教職員においては、感染リスクの高い場所に行く機会を減らす等、一層の感染対策を行う。

- 教職員の感染経路の多くが「不明」である現状を踏まえ、教職員が学校で感染を広げることがないよう、職場外の活動においても、換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等、十分注意する。
- 毎日、出勤前に必ず検温と風邪症状の確認を行い、発熱や風邪症状がある場合は、出勤を控え、管理職等へ連絡する。
- 発熱等の症状がある場合は、まずは、日ごろ通院している医療機関か、自宅の近くにある医療機関に電話で相談する（直接、医療機関を受診せず、事前に必ず電話で相談すること）。かかりつけ医がない等、相談先に困った場合はP7【相談窓口】に電話で相談する。  
P6<相談・受診の目安>にあてはまる場合は、すぐに相談すること。
- 出勤時、管理職等は、教職員に発熱や風邪症状がないことを確認する。  
また、感染者発生時に備え、健康状態の記録を学校で保管する。  
取組例：毎朝、健康状態について、「健康観察カード」（別紙1）を記入し、出勤時に管理職等へ提出する。
- 石けんを使用した手洗いの徹底を図る（出勤後、授業や指導の前後、トイレ後、飲食の前後等）。
- 無症状の感染者も他者へ感染させる恐れがあるので、飛沫飛散防止のため、マスク※を着用するとともに、授業や指導等で児童生徒等と接する際は、可能な限り、身体的距離（おおむね1～2m）の確保に努める。

※教職員は児童生徒等に向かって発声する場面が多いことから、マスクに比べ効果が弱いフェイスシールド・マウスシールドではなく、マスクを着用する。教育活動の中で発音の指導等のため、口の動きを見せる必要がある等の場合は、あらかじめ撮影した動画・画像等を活用する等が考えられるが、やむを得ずフェイスシールドやマウスシールドを使用する場合は、身体的距離を十分に確保すること。

- 「6 基本的な感染症対策の徹底」を参考に、教職員の執務室（職員室、準備室、事務室等）の換気(特に冬場は留意)、教職員の座席等の距離確保、共用の物や施設等の消毒を徹底する。
  - 教職員同士で、昼食等、飲食する場面においても、飛沫を飛ばさない座席配置とし、身体的距離がとれない場合は会話を控える。食事後等に歓談する際は必ずマスクを着用する。
  - 人が集まる会議等については、「密閉」「密集」「密接」及び「大声」をできる限り避け、マスクを着用の上、換気を徹底する。
  - 感染、濃厚接触者等への特定、体調不良等により急遽出勤できなくなる場合を想定して、日頃から教職員間で業務内容や学級の状況等を情報共有しておく等、休みをとりやすい環境を整える。
  - 学校現場で感染症対策や心のケア等を最前線で支える教職員の精神的負担にも鑑み、管理職等は、以下のような教職員のメンタルヘルスにも十分配慮する。
    - ・必要に応じた校務分掌の見直し
    - ・良好な職場環境、雰囲気の醸成
    - ・相談窓口の周知
- ※参考：メンタルヘルス啓発資料「こころさわやかに」  
令和3年3月 千葉県教育委員会
- 校長は、妊娠中の女性教職員に対して、以下を参考にして配慮する。
    - ・「『妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講すべき措置に関する指針』の一部改正について(通知)」(令和2年5月18日付け 教職第218号)
    - ・厚生労働省「妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策」  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_10653.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10653.html)

## <改訂にあたっての参考資料等>

- ・千葉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症への対応について」（「新型コロナウイルス感染症について」、「熱があるときは」等）
- ・「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラインの改訂について（通知）」（令和3年2月19日 文部科学事務次官）
- ・（新型コロナウイルスに関する感染症対策に関する対応について）「教育活動の実施等に関するQ&A」（文部科学省）
- ・「海外から帰国・再入国する児童生徒等への対応について」（令和3年1月26日 文部科学省）
- ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について（通知）」（令和3年1月8日 文部科学省初等中等教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長）
- ・「小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）」（令和3年1月5日 文部科学省初等中等教育局長、スポーツ庁次長、文化庁次長）
- ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～(2021.11.22 Ver.7)」（令和3年11月22日 文部科学省）
- ・「改訂『生きる力』を育む中学校保健教育の手引（追補版）感染症の予防～新型コロナウイルス感染症～」（令和2年3月 文部科学省）
- ・「新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）令和4年1月25日時点版」（厚生労働省）
- ・「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」（厚生労働省、経済産業省、消費者庁）
- ・「新型コロナウイルス対策 ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」（経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構）
- ・「新型コロナウイルス対策 『次亜塩素酸水』を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項」（厚生労働省、経済産業省、消費者庁）
- ・「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 第6.2版（令和4年1月27日）」
- ・「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 改訂2021年8月6日」（国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター）
- ・「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第4版」  
（2021年11月22日一般社団法人 日本環境感染学会）
- ・厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
- ・「新型コロナウイルス感染予防のための給食後の歯みがきスタイル指導」（一般社団法人日本学校歯科医師会）
- ・「小学校、中学校及び高等学校等における新学期に向けた新型コロナウイルス感染症対策の徹底等について（通知）」（令和3年8月20日 文部科学省初等中等教育局健康教育食育課）
- ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインの送付について」（令和3年8月27日 文部科学省初等中等教育局健康教育食育課）
- ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項について」（令和4年2月2日 文部科学省初中等教育局健康教育食育課）

等

## 健康観察カード（例）

年 組 番 氏名 (

)

- ・毎朝、体温を測り、体調等とともに記入してください。
  - ・発熱や風邪症状がある場合は、自宅で休養し学校に連絡とともに、日ごろ通院している医療機関か、自宅の近くにある医療機関に電話で相談してください。自宅近くに医療機関がない場合は、県のホームページに公表されている発熱外来を実施している医療機関に電話で相談してください。**直接、医療機関を受診せず、事前に必ず医療機関へ電話で相談してください。**（発熱外来が近くにない場合は発熱相談センター等へ相談。電話番号は千葉県ホームページを参照）。

少なくともいずれかに該当する場合は、すぐに相談してください。

- ◆息苦しさ(呼吸困難)、強いたるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

- ◆基礎疾患等があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

- ◆上記以外で、発熱や咳など、比較的軽い風邪症状が続く場合

(症狀が続いている場合) 次に、症因に対する個人差を認め、強い症狀と弱い症狀の間で、何らかの関連性がある場合(同様)

※該当する所に○または具体的な内容を記入する。



保護者の皆様へ

## 発熱等がある場合の相談・受診等について

◆発熱等の症状がある場合は、

まずは、日ごろ通院しているかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話でご相談ください。

※直接、医療機関を受診せず、事前に必ず医療機関へ電話で相談をお願いします。

◆かかりつけ医等の地域で身近な医療機関がない場合は、自宅近くの発熱外来を実施している医療機関に電話でご相談ください。

※発熱外来を実施している医療機関の一覧は、千葉県ホームページを参照してください。

【県内の発熱外来指定医療機関】 ※千葉県ホームページ「熱があるときは」のページ内

URL : <https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/hatsunetsu.html>

◆発熱外来が近くにない場合等は、以下の【相談窓口】に電話でご相談ください。

### 【相談窓口】

○発熱相談センター

- ・千葉県発熱相談コールセンター
- ・千葉市・船橋市・柏市の各相談センター

○市町村役場（千葉市・船橋市・柏市を除く）

○発熱相談医療機関

※各相談窓口の電話番号等は千葉県ホームページを参照してください。

◆次の＜相談・受診の目安＞にあてはまる場合は、すぐに相談してください。

### ＜相談・受診の目安＞

少なくともいずれかに該当する場合は、すぐに相談する。

(該当しない場合も相談可)

◆息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

◆基礎疾患等があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合

◆上記以外で、発熱や咳など、比較的軽い風邪症状が続く場合

(症状が続く場合は必ず相談。症状には個人差があるため、強い症状と思う場合はすぐに相談。解熱剤等を飲み続けなければならない場合も同様)

◆小児は小児科医による診察が望ましいため、かかりつけ小児医療機関に相談する。かかりつけ小児医療機関がない場合は、自宅近くの発熱外来を実施している小児医療機関や「千葉県発熱相談コールセンター」に電話でご相談ください。

(裏面へ続きます)

◆保健所からの健康調査を迅速、円滑なものとするため、検査を受検したら、「新型コロナウイルス感染（疑い）者事前登録システム I M A B I S（イマビス）」への登録をお願いします。


※登録方法等は、千葉県ホームページ参照。（「新型コロナウイルス感染症の検査を受検された方へ」のページを参照してください。）

◆ワクチンを接種した後、身体に異常を感じたり、体調不良が続いたりする場合は、「千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口」または医療機関にご相談ください。

#### 【千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口】

電話番号：03-6412-9326 受付時間：24 時間（土・日・祝日含む）

◆発熱等がある場合の相談・受診等の流れ



#### <医療機関を受診するときは・・・>

- ① 必ず電話で事前に連絡する。  
(発熱患者の診療時間・受付・診療場所を分けることがあるため)
- ② 複数の医療機関を受診することは控える。  
(複数の医療機関で、感染が拡大する可能性があるため)
- ③ 医療機関を受診する際は、マスクの着用、手洗い、咳エチケットを徹底する。

## 【消毒方法等（消毒液別）】

別紙3

<b>エタノール</b> <small>消毒用</small>	<p><b>&lt;消毒方法&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消毒用エタノールを浸した布巾やペーパータオルで拭いた後、そのまま乾燥させる。</li> </ul> <p><b>&lt;注意事項&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・揮発性が高く、引火しやすい性質があるため、電気スイッチ等への直接の噴霧はしない。</li> </ul>
<b>家庭用洗剤</b> <small>（新型コロナウイルスに 対する有効性が認められた界面活性剤を含むもの）</small>	<p><b>&lt;消毒方法・注意事項&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パンフレット「ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」（別紙4）を参考に行う。</li> </ul> <p><b>【住宅・家具用洗剤】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品に記載された使用方法どおりに使用する。</li> </ul> <p><b>【台所用洗剤】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗剤をうすめた溶液を布巾やペーパータオルにしみこませ、液が垂れないように絞って拭く。5分程度経ったら、清潔な布等で水拭きし、最後に乾拭きする。</li> <li>・洗剤うすめ液はその都度使い切り、作り置きしない。</li> <li>・手指や皮膚には使用しない。</li> <li>・スプレーボトルで噴霧しない。</li> </ul>
<b>次亜塩素酸ナトリウム消毒液</b>	<p><b>&lt;消毒方法&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パンフレット「0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方」（別紙5）を参考に、市販の家庭用塩素系漂白剤を0.05%に希釀し消毒液を作る。消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭いた後、必ず清潔な布等で水拭きし、乾燥させる。</li> </ul> <p><b>&lt;注意事項&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童生徒等には扱わせない。</li> <li>・消毒液は、絶対に噴霧しない。</li> <li>・希釀した消毒液は、時間が経つにつれ効果が落ちていくので、その都度、使い切りとする。</li> <li>・必ず手袋を着用する。</li> <li>・他の薬品と混ぜない。手指消毒には絶対使用しない。</li> <li>・色落ちしやすいものや腐食の恐れのある金属には使用しない。</li> <li>・使用する家庭用塩素系漂白剤の注意事項をよく読み正しく扱う。</li> </ul>
<b>次亜塩素酸水（一定の条件を満たすもの）</b>	<p><b>&lt;消毒方法&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パンフレット「『次亜塩素酸水』を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項」（別紙6）を参考に行う。</li> <li>・製品に、使用方法、有効成分（有効塩素濃度）、酸性度（pH）、使用期限の表示があることを確認する。</li> <li>・<u>有効塩素濃度80ppm以上のものを使用する。</u></li> <li>・汚れをあらかじめ落としておく。元の汚れがひどい場合などは、有効塩素濃度200ppm以上のものを使うことが望ましい。</li> <li>・十分な量の次亜塩素酸水で表面をヒタヒタに濡らす。少し時間をおき（20秒以上）、きれいな布やペーパータオルで拭き取る。</li> </ul> <p><b>&lt;注意事項&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酸と混ぜたり、塩素系漂白剤と混ぜない（塩素が発生する危険あり）。開栓時は、塩素がすでに発生している可能性に注意する。</li> <li>・人が吸入しないようにする。</li> <li>・濃度が高いものを使う場合、直接手を触れず、手袋を着用する。</li> <li>・塩素系漂白剤等に用いられる「次亜塩素酸ナトリウム」とは別物であり、間違えないよう表示する。</li> <li>・遮光性の容器に入れ、冷暗所で保管する。</li> </ul>
<b>（一定の条件を満たすもの）</b> <small>亜塩素酸水</small>	<p><b>&lt;消毒方法&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・製品の用法、用量に従って必要に応じて希釀する。</li> <li>・遊離塩素濃度25ppm以上の亜塩素酸水をペーパータオル等に染みこませてから対象物を清拭し（拭いた後、数分以上置く）、その後、水気をとって乾燥させる。</li> <li>・有機物が存在する環境下での使用が想定されている。</li> </ul> <p><b>&lt;注意事項&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目に入ったり皮膚についていたりしないよう注意する。飲み込んだり吸い込んだりしないよう注意する。</li> <li>・酸性の製品やそのほかの製品と混同や併用しない。</li> <li>・製品に定められた用法、用量を遵守する。</li> <li>・使用の際は、必ず換気する。</li> <li>・直射日光の当たらない湿気の少ない冷暗所に保管する。</li> </ul>



# ご家庭にある洗剤を使って 身近な物の消毒をしましょう

洗剤に含まれる界面活性剤で新型コロナウイルスが効果的に除去できます

## 試験で効果が確認された界面活性剤

- ▶ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム (0.1%以上)
- ▶ アルキルグリコシド (0.1%以上)
- ▶ アルキルアミンオキシド (0.05%以上)
- ▶ 塩化ベンザルコニウム (0.05%以上)
- ▶ 塩化ベンゼトニウム (0.05%以上)
- ▶ 塩化ジアルキルジメチルアンモニウム (0.01以上)
- ▶ ポリオキシエチレンアルキルエーテル (0.2%以上)
- ▶ 純石けん分 (脂肪酸カリウム) (0.24%以上)
- ▶ 純石けん分 (脂肪酸ナトリウム) (0.22%以上)

※ 新型コロナウイルスに、0.01~0.2%に希釈した界面活性剤を20秒~5分間反応させ、ウイルスの数が減少することを確認しました。詳細はNITEウェブサイトをご覧ください。  
<https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html>

※ これ以外の界面活性剤についても効果がある可能性があり、さらに確認を進めています。

## ご家庭にある洗剤に、どの界面活性剤が使われているか確認しましょう


- 効果が確認された界面活性剤が使われている洗剤のリストをNITEウェブサイトで公開しています（随時更新）  
<https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html>



- 製品のラベルやウェブサイトなどでも、成分の界面活性剤が確認できます。


※製品本体の成分表は関連法令に基づいて表示されているため、含有濃度などの条件によっては、ウェブサイト上のリストと製品本体の成分表が一致しないことがあります。

品名	住宅・家具用合成洗剤		
成分	界面活性剤 (0.2% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤		
液性	弱アルカリ性	正味量	400ml



## 使用上の注意を守って、正しく使いましょう

- 身近なものの消毒には、台所周り用、家具用、お風呂用など、用途にあつた「住宅・家具用洗剤」を使いましょう。
- 安全に使用するため、製品に記載された使用方法に従い、使用上の注意を守って、正しく使いましょう。
- 手指・皮膚には使用しないでください。



本資料は、2020年6月26日現在の知見に基づいて作成されたものです。随時修正されます。

「住宅・家具用洗剤」が手元にない場合には？


## 台所用洗剤を使って代用することもできます。

「住宅・家具用洗剤」を使用する場合は、製品に記載された使用方法どおりに使用してください。

### (1)洗剤うすめ液を作る。

たらいや洗面器などに500mlの水をはり、台所用洗剤\*を小さじ1杯（5g）入れて軽く混ぜ合わせる。

(\*食器洗い機用洗剤ではなく、スポンジなどにつけて使う洗剤です。有効な界面活性剤が使われているかも確認しましょう。)



### (2)対象の表面を拭き取る。

キッチンペーパーや布などに、(1)で作った溶液をしみこませて、液が垂れないように絞る。汚れやウイルスを広げないように、一方向にしっかりと拭き取るようにする。

### (3)水拭きする。

洗剤で拭いてから5分程度たつたら、キッチンペーパーや布などで水拭きして洗剤を拭き取る。特に、プラスチック部分は放置すると傷むことがあるので必ず水拭きする。



### (4)乾拭きする。

最後にキッチンペーパーなどで乾拭きする。

## 台所用洗剤で代用する場合は…

### 安全上の注意

- 手指・皮膚には使用しないでください。
- スプレー・ボトルでの噴霧は行わないでください。

### 効果的に使うためのポイント

- 作り置きした液は効果がなくなるので、洗剤うすめ液は、その都度使い切りましょう。
- 台所用洗剤でプラスチック部分（電話、キーボード、マウス、TVリモコン、便座とフタ、照明のスイッチ、時計など）を拭いた場合、そのまま放置すると傷むことがあります。必ず、すぐに水拭きしましょう。
- 塗装面（家具、ラッカー塗装部分、自動車の塗装面など）や、水がしみこむ場所や材質（布製カーテン、木、壁など）には使わないでください（シミになるおそれがあります）。

## 参考

## 0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方



【使用時の注意】  
 ・換気をしてください。  
 ・家事用手袋を着用してください。  
 ・他の薬品と混ぜないでください。  
 ・商品パッケージや HP の説明をご確認ください。

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。  
 商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

メーカー (五十音順)	商品名	作り方の例
花王	ハイター キッチンハイター	<b>水 1L に本商品 25mL (商品付属のキャップ 1 杯) *</b> <small>※次亜塩素酸ナトリウムは、一般的にゆっくりと分解し、濃度が低下していきます。購入から 3 ヶ月以内の場合は、水 1L に本商品 10ml (商品付属のキャップ 1/2 杯) が目安です。</small>
カネヨ石鹼	カネヨブリーチ カネヨキッチンブリーチ	<b>水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)</b>
ミツエイ	ブリーチ キッチンブリーチ	<b>水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)</b>

## (プライベートブランド)

ブランド名 (五十音順)	商品名	作り方の例
イオングループ (トップバリュ)	キッチン用漂白剤	<b>水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)</b>
西友 / サニー / リヴィン (きほんのき)	台所用漂白剤	<b>水 1L に本商品 12mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)</b>
セブン&アイ・ ホールディングス (セブンプレミアム ライフスタイル)	キッチンブリーチ	<b>水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)</b>

※上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。  
 表に無い場合、商品パッケージや HP の説明にしたがってご使用ください。

洗剤の使い方はこちら▶▶  
[こちらをクリック](#)



# 新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。

石けんやハンドソープを使った  
丁寧な手洗いを行ってください。



手洗いを丁寧に行なうことで、  
十分にウイルスを除去できます。  
さらにアルコール消毒液を  
使用する必要はありません。

手洗い	残存ウイルス	
手洗いなし	約 100 万個	
石けんや ハンドソープで 10秒もみ洗い後 流水で 15秒すすぐ	1 回	約 0.01% (数百個)
	2 回 繰り返す	約 0.0001% (数個)

(森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006 から作成)

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、  
熱水や塩素系漂白剤、及び一部の洗剤が有効です。



食器や箸などは、80°Cの熱水に  
10分間さらすと消毒ができます。  
火傷に注意してください。



濃度 0.05% に薄めた上で、  
拭くと消毒ができます。  
ハイター、ブリーチなど。  
裏面に作り方を表示しています。

※目や肌への影響があり、  
取り扱いには十分注意が必要です。  
※必ず製品の注意事項をご確認ください。  
※金属は腐食することがあります。



有効な界面活性剤が含まれる  
「家庭用洗剤」を使って  
消毒ができます。  
NITE ウェブサイトで  
製品リストを公開しています。

NITE 洗剤リスト 検索

こちらをクリック



注意!

次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）とは別のものです。

# 「次亜塩素酸水」を使って モノのウイルス対策をする場合の 注意事項

別紙6  
アルコールとは使い方が違います

**拭き掃除には、有効塩素濃度80 ppm以上のものを使いましょう**

※ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム等の粉末を水に溶かしたものを使う場合、有効塩素濃度100 ppm以上のものを使いましょう。  
※その他の製法によるものは、製法によらず、必要な有効塩素濃度は同じです。


## ①汚れをあらかじめ落としておく

目に見える汚れはしっかり落としておきましょう。

元の汚れがひどい場合などは、有効塩素濃度200 ppm以上のものを使うことが望ましいです。

## ②十分な量の次亜塩素酸水で表面をピタピタに濡らす

アルコールのように少量をかけるだけでは効きません。



## ③少し時間をおき（20秒以上）、 きれいな布やペーパーで拭き取る

新型コロナウイルスに有効な  
消毒・除菌方法一覧はこちら。



### 安全上の注意


- 製品に記載された使用上の注意を正しく守ってください。
- 希釈用の製品は正しく希釀して使いましょう。
- 酸と混ぜたり、塩素系漂白剤と混ぜたりすると、塩素が発生する危険があります。  
(また、開栓時は、塩素が既に発生している可能性に注意してください。)
- 人が吸入しないように注意してください。人がいる場所で空間噴霧すると吸入する恐れがあります。
- 濃度が高いものを使う場合、直接手をふれず、ゴム手袋などを着用してください。

### 効果的に使うためのポイント

- 使用の際は、酸性度・有効塩素濃度や使用期限等を確認しましょう。
- 有機物に弱いため、汚れを落としてから使用してください。
- 空気中の浮遊ウイルスの対策には、消毒剤の空間噴霧ではなく、換気が有効です。

本資料は、2020年6月26日現在の知見に基づいて作成されたものです。修正されることがあります。

## 流水で掛け流す場合、有効塩素濃度35ppm以上のものを使いましょう



### ①汚れをあらかじめ落としておく

目に見える汚れはしっかり落としておきましょう。

### ②次亜塩素酸水の流水で、 消毒したいモノに20秒以上掛け流す

次亜塩素酸水の生成装置から直接、流水掛け流しを行ってください。

アルコールのように少量をかけるだけでは効きません。

### ③表面に残らないよう、 きれいな布やペーパーで拭き取る

## 次亜塩素酸水を購入・使用するときのポイント

- 製品に、使用方法、有効成分（有効塩素濃度）、酸性度（pH）、使用期限の表示があることを確認しましょう。
- 紫外線で次亜塩素酸が分解されるため、遮光性の容器に入れるとともに、冷暗所で保管してください。
- 塩素系漂白剤等に用いられている次亜塩素酸ナトリウムは、別物です。人体への刺激性が強いので、間違えないよう表示を確認しましょう。
- ご家庭等で次亜塩素酸水を自作すると、塩素が発生する可能性があり、危険です。

※新型コロナウイルスに、次亜塩素酸水を20秒反応させたところ、35ppm以上（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムは100ppm以上）で、有効性が確認されました。詳細はNITEウェブサイトをご覧ください。<https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html> なお、本評価作業は対象物と接触させて消毒する場合の効果を評価したものです。手指等への影響、空間噴霧の有効性・安全性は評価していません。

※本資料では、「次亜塩素酸水」は「次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液」を指しています。  
電気分解によって生成された「電解型次亜塩素酸水」と、次亜塩素酸ナトリウムのpH調整やイオン交換、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムの水溶などによって作られた「非電解型次亜塩素酸水」の両方を含むものです。

※人体に付着したウイルスの消毒・除去や、感染の予防・治療を目的とする場合は、医薬品又は医薬部外品としての承認が必要です。現時点において「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた製品は存在しません。

本資料は、家庭やオフィス、店舗などにおいて、次亜塩素酸水を新型コロナウイルス対策に用いる場合の使用方法をまとめたものです。薬機法、食品衛生法等に基づいて使用する場合は、各法令に従ってください。

# 新型コロナワクチン接種による児童生徒へのいじめの防止について

新型コロナウイルス感染を予防したり、重症化を防いだりするために新型コロナワクチンの接種が各自治体により進められています。すでに接種をしている人もいることでしょう。そこで、新型コロナワクチン接種について、知っておいてほしいことがあります。

一つ目は、ワクチン接種は本人の希望により行うものであり、接種を望まない人もいること、二つ目は、身体的な理由や様々な理由によって接種できない人もいることです。ですから、ワクチン接種について、一人一人の考え方や事情を思いやるという行動が大切です。

そのために、皆さんにできることについて考えてみましょう。

## ○安心して生活するために私たちができること

- ・ワクチン接種をしたかどうか、無理に聞かないようにしましょう。
- ・ワクチン接種をしようとしている人に、接種をやめるよう言わないようにしましょう。
- ・ワクチン接種をしていない人に、接種を無理強いしないようにしましょう。
- ・ワクチン接種を理由とした、  
仲間はずれやいじめは絶対にやめましょう。
- ・相手の立場や気持ちを考えて、  
思いやりのある行動を心がけましょう。



千葉県マスコット  
キャラクター  
チーバくん

ワクチン接種を受ける又は受けないことによって、傷つけたり傷つけられたりすることはとても悲しいことです。もし、仲間を傷つけるような言葉や行動を見つけたら、注意してください。不安な気持ちを抱えている人を見かけたら、優しく声をかけるなど、支えてあげてください。

もし傷つけられたら、必ず相談をしてください。先生や信頼できる大人に必ず伝えてください。

これらのことは全てのいじめについて同じことが言えます。相手の立場になって思いやりをもって行動し、皆さん之力で安心して過ごすことができる学校をつくりましょう。

心配なことや、困ったことがあれば、先生や家の人に相談しましょう。  
相談しにくい時は、下の電話番号でも相談ができます。

相談窓口	24時間子供SOSダイヤル	0120-0-78310
	子どもと親のサポートセンター	0120-415-446
	千葉県新型コロナウイルス関連肺炎にかかる相談窓口	
	9時から17時まで	043-223-2640

